

Республика Казахстан, е-mail:ardak.68kz@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-9842-7779>, тел. +77025135377

Құнанбаева Нұргұл Серікқызы – магистр биология, старший преподаватель Казахстан, Alikhan Bokeikhan University, үл. Мангилийк ел 11. Факультет информационный технология и экономика, Кафедра прикладной биология <https://orcid.org/0009-0004-0693-9528>, e-mail:nskunanbayeva78@mail.ru

Information about the authors

Kozhavkova Ardark Janketaevna* – candidate of agricultural sciences, professor, Kazakh National Agrarian Research University, Republic of Kazakhstan, 050070, Almaty, st. Zhualy, 44, e-mail:ardak.68kz@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-9842-7779>

Kunanbayeva Nurgul Serikkyzy –master's degree in Biology, Senior Lecturer Kazakhstan, Alikhan Bokeikhan University, ul. Mangilik el 11. Faculty of Information Technology and Economics, Department of Applied Biology <https://orcid.org/0009-0004-0693-9528>, e-mail:nskunanbayeva78@mail.ru

Ветеринария

МРНТИ 68.41.55

С.Д.Тусупов¹

¹ НАО «Шәкәрім университет» область Абай, г.Семей, ул. Глинки 20А, 071412, Казахстан, e-mail:serik_tussupov@mail.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МЕРЫ БОРЬБЫ С ЭЙМЕРИОЗОМ ВЕРБЛЮДОВ В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ОБЛАСТИ АБАЙ

Аннотация: В статье рассматривается распространение и меры борьбы с эймериозом верблюдов в крестьянских хозяйствах области Абай, Казахстан.

Исследование охватывает 2160 голов верблюдов, включая молодняк и взрослых особей, с использованием методов дифференциации видов эймерий по ооцистам. Выявлены три основных вида эймерий: *E.dromedarii*, *E.cameli* и *E.noelleri*, с описанием их морфологических характеристик и сроков споруляции.

В ходе проведенных исследований было выяснено, что в животноводческих хозяйствах области Абай эймериоз верблюдов встречается повсеместно.

Для изучения сезонно-возрастной динамики зараженности верблюдов эймериями было исследовано 1080 голов верблюдов разных возрастов, 347 голов (12%) из них заражены эймериями. Исследования проводились ежемесячно в крестьянских хозяйствах Абайского и Аксуатского районов области Абай.

Для выявления факторов заражения верблюдов эймериями были проведены исследования на наличие ооцист эймерий в образцах навоза из клеток, остатках корма на полу и в кормушках, а также в воде с места водопоя и других объектах.

В своей работе мы обратили внимание, прежде всего на следующие лекарственные препараты: коккимед и амидостат, так как они впервые были испытаны против эймериоза верблюдов.

Результаты исследования подчеркивают важность повышения информированности фермеров о методах диагностики и профилактики эймериоза, а также необходимость разработки эффективных стратегий контроля заболевания.

Это позволит улучшить условия содержания верблюдов и повысить продуктивность крестьянских хозяйств в регионе.

Ключевые слова: Эймерии, ооцисты, верблюды, паразиты, сезонно-возрастная динамика, коккимед, амидостат, резервуары.

Введение

Эймериоз верблюдов, вызванный простейшими организмами рода **Eimeria**, представляет собой серьезную проблему для животноводства в Казахстане, в частности области Абай. Верблюды являются важным элементом сельского хозяйства в этом регионе, обеспечивая не только продовольствие, но и средства к существованию для многих крестьянских хозяйств. В данной статье рассматриваются особенности распространения эймериоза, его влияние на здоровье животных и экономику хозяйств, а также меры борьбы с этим заболеванием.

Актуальность

Эймериоз верблюдов является одной из наиболее распространенных паразитарных болезней, затрагивающих здоровье животных и, следовательно, благосостояние крестьянских хозяйств. В условиях области Абай, где климатические и экологические условия способствуют распространению паразитов, необходимо уделить особое внимание профилактике и лечению этого заболевания.

Актуальность исследования также подтверждается недостаточной информированностью местных фермеров о методах диагностики и борьбы с эймериозом, что делает проблему более острой.

Новизна данного исследования состоит в комплексном подходе к изучению эймериоза у верблюдов в регионе Абай. В отличие от ранее проведенных исследований, в этой работе будет рассмотрена не только степень распространения заболевания, но и его воздействие на продуктивность животных, а также предложены новые методы диагностики и профилактики.

Эймериоз верблюдов вызывается простейшими, которые обитают в кишечнике животных. Основные факторы, способствующие распространению заболевания, включают: плохие санитарные условия, высокая плотность поголовья и недостаточная вентиляция способствуют распространению инфекций; влажный климат и высокая температура способствуют выживанию ооцист, что увеличивает вероятность заражения; неправильное или недостаточное питание ослабляет иммунную систему верблюдов, делая их более уязвимыми к инфекциям.

Методы исследования

Исследование проводилось в период с 2024 по 2025 год в НАО «Государственный университет имени Шакарима города Семей» на базе лаборатории паразитологии. Всего было обследовано 2160 животных: из них 1080 верблюжат возрастом до 1 года, 648 молодняка и 432 взрослых особей. Анализ фекалий осуществляли с помощью копрологических методов, включая метод Дарлинга и метод Фюллеборна. Для дифференциации видов эймерий использовали руководство В.Л. Якимова и определительные таблицы Е.М. Хейсина и Н.П. Орлова. При этом учитывались такие характеристики ооцист, как форма, размер, цвет, строение оболочки, наличие полярной гранулы и остаточного тела в ооцистах и спороцистах, а также время споруляции.

Результаты исследований

В результате проведенных исследований в хозяйствах: КХ «Тарту», КХ «Миалы», КХ «Кіндікті» Абайского района; с. Жәнтікей, с. Екпін и с. Жеті Арас Аксуатского района нами выявлены следующие виды эймерий:

1. ***E.dromedarii*** – ооцисты овальные с шапочкой, оболочка коричневая.
2. Ширина шапочки 6,7 x 8,1 мкм, стеки – 1,3 мкм. Размер ооцист 22,9-32,4x18,9-25,6 мкм, в среднем – 27,6x22,2 мкм. Спорогония 15-17 суток.
3. ***E.cameli*** – ооцисты круглые, с микропиле, полярной шапочки нет.
4. Микропиле шириной 5,4-6,3 мкм. Размеры 24,2-40,5x16,2-29,7 мкм, в среднем – 32,3x22,9 мкм. Споры 14,8-17,5x9,4-10,8 мкм, в среднем – 16,1x10,1 мкм. Спорогония 10-15 суток.
5. ***E.noelleri*** – ооцисты широкоовальные, с микропиле и трехслойной оболочкой, средняя оболочка толстая, желтого цвета. Размеры 81,0-98,5x64,8-81,0 мкм, в среднем – 89,7x72,9 мкм. Толщина стеки 10,8x14,8 мкм. Споры 39,1-48,6x14,8-24,3 мкм, в среднем – 43,8x19,5 мкм. Спорогония 6-8 суток.

В ходе выполненных исследований было выявлено, что в животноводческих хозяйствах области

Абай эймериоз верблюдов встречается повсеместно.

Таблица 1 – Уровень заражённости верблюжат текущего года рождения и молодняка в возрасте 1–1,5 лет и взрослого поголовья в хозяйствах Абайского района

№	Наименование хозяйства	Верблюжата текущего года рождения		Молодняк от 1 года до 1,5 лет		Взрослое поголовье	
		ЭИ, %	ИИ, ооцист	ЭИ, %	ИИ, ооцист	ЭИ, %	ИИ, ооцист
1.	КХ «Миалы»	100	1-250	80	1-20	60	1-10
2.	КХ «Тарту»	94	1-200	45	1-5	30	1-3
3.	КХ «Кіндікті»	100	1-100	75	1-15	50	1-10

Таблица 2 – Зараженность верблюжат текущего года рождения, молодняка 1-1,5 лет и взрослого поголовья в хозяйствах Аксуатского района

№	Наименование хозяйства	Верблюжата текущего года рождения		Молодняк от 1 года до 1,5 лет		Взрослое поголовье	
		ЭИ, %	ИИ, ооцист	ЭИ, %	ИИ, ооцист	ЭИ, %	ИИ, ооцист
1.	с. Жәнтікей	100	1-200	78	1-28	55	1-8
2.	с. Екпін	96	1-80	65	1-12	47	1-5
3.	с. Жеті арал	85	1-50	50	1-15	25	1-3

Для изучения сезонно-возрастной динамики зараженности верблюдов эймериями было исследовано 1080 голов верблюдов разных возрастов, 347 голов (12%) из них заражены эймериями. Исследования проводились ежемесячно в крестьянских хозяйствах Абайского и Аксуатского районов области Абай.

Таблица 3 – Зараженность верблюжат текущего года рождения, молодняка 1-1,5 лет и взрослого поголовья в хозяйствах Аксуатского района

Месяцы года	Верблюжата		Молодняк		Взрослые	
	ЭИ, %	ИИ, ооц.	ЭИ, %	ИИ, ооц.	ЭИ, %	ИИ, ооц.
Январь	20 - 25	2 - 33	15 - 20	1 - 3	8 - 15	1 - 2
Февраль	15 – 20	1 – 17	10 – 15	1 – 2	10 – 12	1 – 2
Март	25 - 35	1 - 30	20 - 25	1 – 2	15 - 20	1 - 2
Апрель	35 – 45	5 - 61	25 - 30	1 - 3	20 - 25	1 - 2
Май	47 - 55	10 – 92	30 - 40	1 - 4	20 - 28	1 - 3
Июнь	70 - 79	10 - 120	45 - 55	1 - 7	35 - 40	1 - 4
Июль	75 - 81	15 - 180	60 - 70	1 - 8	40 - 45	1 - 6
Август	88 - 94	20 - 235	72 - 77	1 - 12	45 - 55	1 - 8
Сентябрь	75 - 86	15 - 195	50 - 68	1 - 15	30 - 48	1 - 7
Октябрь	65 - 72	10 - 115	45 - 55	1 - 9	28 - 35	1 - 3
Ноябрь	57 - 63	15 - 78	40 - 50	1 - 5	25 - 30	1 - 3
Декабрь	30 - 38	5 - 46	15 - 25	1 - 4	10 - 18	1 - 2

По данным таблицы 3 видно, что наибольшая и наименьшая инвазированность верблюдов в хозяйствах Аксуатского района по сезонам года и возрастам следующая:

- верблюжата текущего года рождения – пик инвазии приходится с июня по октябрь с ЭИ 65 – 94% при ИИ от 15 до 235 ооцист эймерий. Наименьшая ЭИ приходится на январь – май – 15 – 55% при ИИ 1 – 92 ооцисты и ноябрь – декабрь – 30 – 63% с ИИ 5 – 78 ооцист в микроскопическом поле;

- молодняк 1 – 1,5 лет: с июля по август ЭИ 60 – 77% при ИИ 1 – 12 ооцист. Наименьшая ЭИ в январе – июне – 10 – 55% при ИИ 1 – 7 ооцист и в сентябре – декабре – 15 – 68% с ИИ 1 – 15 ооцисты;

- у взрослого поголовья колебания в течение года менее выражены, но наибольшая ЭИ (35 – 55%) с июня по август при ИИ 1 – 8 ооцисты. Наименьшая ЭИ приходится на январь – апрель – 8 – 28% с ИИ 1 – 3 ооцисты и сентябрь – декабрь – 10 – 48% с ИИ 1 – 7 ооцист.

Таблица 4 – Зараженность верблюжат текущего года рождения, молодняка 1-1,5 лет и взрослого поголовья в хозяйствах Абайского района

Месяцы года	Верблюжата		Молодняк		Взрослые	
	ЭИ, %	ИИ, ооц.	ЭИ, %	ИИ, ооц.	ЭИ, %	ИИ, ооц.
Январь	25 – 35	5 – 35	15 – 25	1 – 4	10 – 18	1 – 2
Февраль	20 – 30	1 – 20	10 – 20	1 – 3	10 – 15	1 – 3
Март	30 – 40	2 – 40	25 – 30	1 – 3	20 – 25	1 – 2
Апрель	45 – 55	5 – 75	30 – 35	1 – 4	25 – 28	1 – 2
Май	45 – 60	10 – 100	30 – 45	1 – 5	25 – 30	1 – 3
Июнь	70 – 80	10 – 145	50 – 60	1 – 8	40 – 45	1 – 5
Июль	85 – 95	15 – 200	70 – 75	1 – 10	45 – 50	1 – 8
Август	85 – 100	20 – 250	70 – 80	1 – 15	55 – 60	1 – 10
Сентябрь	60 – 70	15 – 200	55 – 75	1 – 20	45 – 50	1 – 10
Октябрь	75 – 85	10 – 130	50 – 60	1 – 12	40 – 45	1 – 7
Ноябрь	80 – 90	5 – 70	45 – 55	1 – 7	30 – 35	1 – 4
Декабрь	35 – 40	5 – 50	20 – 30	1 – 5	12 – 20	1 – 3

По данным таблицы 4 видно, что наибольшая и наименьшая инвазированность верблюдов в хозяйствах Абайского района по сезонам года и возрастам следующая:

- верблюжата текущего года рождения – пик инвазии приходится с июня по ноябрь с ЭИ 60 – 100% при ИИ от 5 до 250 ооцист эймерий. Наименьшая в январе – мае ЭИ 20 – 60% и декабре 35 – 40% с ИИ соответственно 1 - 100 и 5 - 50 ооцист;

- молодняк 1 – 1,5 лет: июнь – октябрь с ЭИ 50 – 80% при ИИ 1 – 20 ооцист. Наименьшая в январе – мае (10 - 45%) и ноябре – декабре (20 – 55%) при ИИ 1 – 5 и 1 – 7 ооцист соответственно;

- у взрослого поголовья наибольшая ЭИ (40 - 60%) с июня по октябрь при ИИ 1 – 10 ооцисты. Наименьшая ЭИ в январе – апреле - 10 – 25% при ИИ 1 – 3 ооцисты и ноябре – декабре – ЭИ 12 - 35% при ИИ 1 – 4 ооцисты.

Для выявления факторов заражения верблюдов эймериями проведены исследования на наличие ооцист эймерий в образцах навоза из клеток, остатках корма на полу и в кормушках, а также в воде с места водопоя и других пробах.

Таблица 5 – Зараженность эймериями объектов внешней среды

Время исследования	Общее кол-во проб	Кол-во загрязненных проб	Количество ооцист		
			Спорулированных	Неспорулированных	Деформированных
1. Пробы из кормушек					
Июнь	20	12	8	13	7
Июль	10	8	4	7	6
2. Остатки грубых кормов					
Июнь	20	6	5	9	3
Июль	10	8	4	11	6
3. Остатки мелких кормов на дне кормушек (влажные)					
Июнь	20	11	16	18	9
Июль	10	8	9	13	8
4. Пробы гранулированного корма					
Июнь	20	-	-	-	-
Июль	10	-	-	-	-
5. Пробы силоса					
Июнь	20	-	-	-	-
Июль	10	-	-	-	-
6. Остаток воды на дне поилок					
Июнь	20	2	-	3	-
Июль	10	-	-	-	-
7. Пробы подстилки из клеток					
Июнь	20	14	17	21	11
Июль	10	7	14	17	8

Как видно из таблицы 5, при исследовании проб из кормушек и остатков влажных мелких кормов было обнаружено небольшое количество ооцист эймерий. В 11 загрязнённых пробах остатков мелких кормов количество спорулированных и неспорулированных ооцист оказалось выше, чем количество деформированных — соответственно 16, 18 и 9. Из 20 исследованных проб воды из поилок в 2 пробах были выявлены 3 неспорулированных ооцисты, что указывает на загрязнение поилок ооцистами эймерий.

Далее были проанализированы пробы подстилки из клеток, в которых содержатся животные. В июне ооцисты обнаружены в 14 из 20 проб, а в июле — в 7 из 10 проб. Таким образом, наибольшая степень загрязнения эймериями зафиксирована в пробах подстилки из клеток. В каждой загрязнённой пробе количество ооцист колебалось от 4 до 13 в поле зрения микроскопа.

Ооцисты эймерий были найдены в подстилке, взятой соскобом с деревянных полов, на которых содержатся верблюды. Эти данные свидетельствуют о несвоевременной уборке навоза в помещениях, что является фактором заражения животных эймериями.

Кроме того, одним из факторов заражения верблюжат эймериями является вымя верблюдиц. Было проведено исследование смыков с вымени верблюдиц и шерсти вокруг вымени (см. таблицу 6).

Таблица 6 – Загрязненность вымени верблюдиц эймериями в подсосный период

Мес яц	Кол-во исследованных проб	Кол-во загрязненных проб	Количество ооцист		
			Спорулированных	Неспорулированных	Деформированных
Февраль	10	3	5	10	2
Март	10	4	8	7	3
Апрель	10	3	10	10	2
Всего	30	10	23	27	7

Как видно из таблицы 6, в смыках с загрязненного вымени ооцисты эймерий содержатся в небольшом количестве. Так, в феврале в смыках с вымени 3 верблюдиц из 10 были обнаружены ооцисты: спорулированные – 5, неспорулированные – 10, деформированные – 2.

В марте у 4 голов верблюдиц выявлены 8 спорулированных ооцист, 7 неспорулированных и 3 деформированных. В апреле у 3 голов из десяти обследованных обнаружены 10 спорулированных, 10 неспорулированных и 2 деформированных ооцисты.

В 30 пробах смыков с вымени и шерсти вокруг вымени ооцисты эймерий установлены в 10 пробах. При этом количество спорулированных ооцист было равно 23, неспорулированных – 27, а деформированных – 7.

Исследования на содержание ооцист эймерий также проводились в пастбищный период. Были проанализированы пробы навоза из клеток, остатки корма с поверхности пола под ногами животных и из кормушек, трава с пастбища, почва из загонов, вода с места водопоя и другие образцы. Для таких объемных проб, как остатки корма, трава с пастбища и подобные, применяли метод накопления ооцист (см. таблицу 7).

Наибольшее количество ооцист эймерий выявлено в навозе из клеток, почве с территории фермы, воде из луж на территории фермы и остатках корма, найденных под ногами животных.

Таблица 7 – Резервуары заражения животных

№	Наименование пробы	Кол-во проб и вес каждой в граммах	Макс. кол-во ооцист в мазке из указанного кол-во проб	
			Всего	Спорулиров.
1.	Навоз из клеток	10 x 5	150	-
2.	Остатки корма в кормушке	10 x 10	5	-
3.	Остатки корма из-под ног животных	1 x 100	12	2
4.	Почва с территории фермы	1 x 100	8	5
5.	Вода из луж на территории фермы	10 x 10	6	2
6.	Трава с пастбища	40 x 100	3	1

Особенно интенсивными факторами заражения животных являлись остатки корма из-под ног животных, где корм обычно загрязнен фекалиями. При содержании большой группы животных на ограниченных участках может приводить к подобному заражению

Одним из основных мероприятий в профилактике эймериоза у животных является недопущение загрязнения кормов и воды фекалиями, поскольку они в большинстве случаев содержат ооцисты эймерий.

В настоящее время, ввиду широкого применения противоэймерийных препаратов, возникает проблема развития устойчивости паразитов к лекарственным средствам. Для эффективной борьбы с эймериозом необходима разработка чёткой программы применения лекарств, включающей зонирование и периодическую смену препаратов.

В последние годы при лечении эймериоза чаще всего используют химокцид-7, норсульфазол, сульфаниламидные препараты и некоторые антибиотики. Тем не менее, терапия и профилактика эймериоза верблюдов остаются недостаточно разработанными.

В связи с этим в наших исследованиях было решено изучить эффективность некоторых химиопрепаратов при эймериозе верблюдов. Особое внимание мы уделили препаратам «Коккимед» и «Амидостат», которые впервые были испытаны против эймериоза у этих животных.

Опыты проводились на животных, заражённых эймериями как экспериментально, так и спонтанно. Испытания препарата «Коккимед» были проведены на 40 верблюдах. Эффективность препарата (ЭИ) составила 100 % при интенсивности инфекции (ИИ) от 10 до 200 ооцист в поле зрения микроскопа (увеличение 7×8).

Верблюдам первой группы (10 голов) давали «Коккимед» в дозе 10 мг/кг массы тела один раз в день с кормом в течение 5 дней подряд. Во второй группе (10 голов) препарат применяли в дозе 15 мг/кг массы тела, также один раз в день с кормом в течение 5 дней. Третья группа (10 голов) получала «Коккимед» в дозе 20 мг/кг живой массы один раз в день в течение 5 дней подряд. Верблюдам 4 группы (10 голов - контрольная) препараты не задавали.

После применения препаратов проводили копрологические исследования.

При этом у верблюдов 1 группы ЭИ составила 30% при ИИ 1 - 25 ооцист эймерий.

У верблюжат 2 группы ооцисты эймерий обнаружены у 2 животных при ИИ 2 - 10 ооцист.

У верблюжат из 3 группы ооцисты эймерий не обнаруживались. Таким образом, экстенсивность коккимеда против эймерий составила 90%, интенсивность – 94,3%.

У верблюжат 4 группы наблюдали повышение ЭИ до 100% при ИИ от 50 до 120 ооцист эймерий.

Таблица 8 – Применение коккимеда при спонтанном эймериозе верблюдов

№ групп	Кол-во животных	Доза в схеме применения	Степень инвазии, ооцист в 1 поле зрен. микроск.	
			До опыта	На 6 сутки
1	1	В дозе 10 мг/кг в течение 5 дней	45	Не обнаружено
	2		50	—«»-
	3		70	1-25 ооцист
	4		65	—«»-
	5		40	1-10
	6		70	—«»-
	7		55	1-20
	8		50	—«»-
	9		200	—«»-
	10		50	—«»-

Продолжение таблицы 8

1	В дозе 15 мг/кг в течение 5 дней	50	Не обнаружено —«»- —«»- 2-10 ооцисты 3-4 ооцисты —«»- —«»- —«»- —«»- —«»-	
2		30		
3		75		
4		55		
5		100		
6		75		
7		70		
8		150		
9		80		
10		90		
1	В дозе 20 мг/кг 5 дней подряд	55	Не обнаружено	
2		60		
3		75		
4		60		
5		55		
6		50		
7		80		
8		100		
9		85		
10		85		
1	Контроль	75	60 55 30 120 80 65 70 55 100 50	
2		55		
3		55		
4		60		
5		85		
6		75		
7		55		
8		60		
9		60		
10		65		

Испытание амидиостата проведено на спонтанно зараженных животных эймериями верблюдов. ЭИ в проведенных сериях опытов составила 100% при ИИ 20-100 ооцист в поле зрения микроскопа (ув.7x8).

В первом варианте амидиостат давали в дозе 10 мг/кг массы тела животного 1 раз в день в течение 5 дней. В конце опыта ЭИ составила 28,5% при ИИ 3-30 ооцист в поле зрения микроскопа. При этом экстенсэфективность препарата против эймерий составила 71,5%, а интенсэфективность – 72,5%.

Во втором варианте амидиостат применяли в дозе 15 мг/кг живой массы животного 1 раз в день в течение 5 дней подряд. В конце опыта ЭИ составила 14,2% при ИИ 2-12 ооцист в поле зрения. При этом экстенсэфективность амидиостата составила 85,8%, интенсэфективность – 88,4%.

В третьем варианте препарат давали животным в дозе 20 мг/кг массы тела животного 1 раз в день 5 дней подряд. В конце опыта ооцист эймерий не обнаруживали.

Таким образом, в третьем варианте экстенсэфективность и интенсэфективность амидиостата против эймерий составила 100%.

Таблица 9 – Применение амидостата при спонтанном эймериозе верблюдов

№ группы	Кол-во животных	Доза в схеме применения	Степень инвазии, ооцист в 1 поле зрен. микроск.	
			До опыта	На 6 сутки
1	1	В дозе 10 мг/кг в течение 5 дней	45	Не обнаружено
	2		50	—«»-
	3		70	1-30 ооцист
	4		65	—«»-
	5		250	1-15
	6		75	—«»-
	7		60	1-10
	8		50	—«»-
	9		45	—«»-
	10		55	—«»-
2	1	В дозе 15 мг/кг в течение 5 дней	50	Не обнаружено
	2		60	—«»-
	3		75	—«»-
	4		55	2-12 ооцисты
	5		150	3-4 ооцисты
	6		80	—«»-
	7		70	—«»-
	8		55	—«»-
	9		80	—«»-
	10		100	—«»-
3	1	В дозе 20 мг/кг 5 дней подряд	55	
	2		60	
	3		75	
	4		65	
	5		55	Не обнаружено
	6		50	
	7		80	
	8		100	
	9		90	
	10		85	
4	1	Контроль	75	60
	2		50	55
	3		55	45
	4		60	80
	5		85	120
	6		70	65
	7		55	60
	8		60	55
	9		50	45
	10		65	50

В современных условиях ведения животноводческого хозяйства важное место занимают лечебно-профилактические мероприятия против эймериоза верблюдов.

Эймериозная инвазия причиняет большой экономический ущерб, складывающийся из падежа животных, снижения продуктивности и живой массы верблюдов, уменьшения привесов среди молодняка, повышения восприимчивости к инвазионным и инфекционным заболеваниям.

Подводя итог вышеизложенному, следует добавить, что нами рекомендуются для внедрения в производство амидиостат, коккимед для терапии и профилактики эймериоза верблюдов.

Заключение

Эймериоз верблюдов представляет собой серьезную угрозу для крестьянских хозяйств области Абай. Эффективная борьба с этим заболеванием требует комплексного подхода, включающего профилактические меры, правильное лечение и образовательные инициативы.

Устранение факторов, способствующих распространению эймериоза, и повышение уровня знаний среди фермеров позволяют значительно снизить заболеваемость и улучшить экономические показатели в регионе.

Литература

1. Тажбаева Д.Т., Аманжол Р.А., Сулейменов М.Ж. Видовой состав и эпизоотическая ситуация по стронгилятозам сельскохозяйственных животных в Западно-Казахстанской области // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2014. №15.
2. Щемелева Н. Ю., Дударчук А. Н., Василькова В. П., Насонов И. В. Эймериозы сельскохозяйственных животных и птиц // Животноводство и ветеринарная медицина. 2021. №1. С.64-68.
3. Никонорова В. Г., Белова Л. М., Гаврилова Н. А. Сезонные колебания сочленов паразитарного биоценоза низинных (заливных) и суходольных пастбищ // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2022. №4 (56). С. 20-25.
4. Сулейменов М.Ж., Абдыбекова А.М., Тлепов А.А., Туганбаев А., Джусупбекова Н.М. Распространение возбудителей паразитарных зоонозов в Казахстане // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2014. №15.
5. Gündög SÖ, Çelik F, Şimşek S. Evaluation of Parasitic Diseases in Patients Brought to Fırat University Animal Hospital. Turkiye Parazitol Derg. 2021 Dec 2;45(4):268-273. English. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.43534. PMID: 34889194.
6. Dana D, Suleiman S, Workneh N, Massa D, Levecke B, Kifleyohannes T, Anisuzamman, Mekonnen Z. Cystic echinococcosis, a food-borne zoonotic neglected tropical disease in slaughtered cattle at Jimma Town municipal abattoir, Southwest Ethiopia. Ann Parasitol. 2021;67(4):627-635. doi: 10.17420/ap6704.379. PMID: 35247303.
7. Chihai O, Umhang G, Erhan D, Boué F, Tălămbuță N, Rusu Ş, Zamornea M. Slaughterhouse survey of cystic echinococcosis in cattle and sheep from the Republic of Moldova. J Helminthol. 2016 May;90(3):279-83. doi: 10.1017/S0022149X15000103. Epub 2015 Mar 2. PMID: 25727141.
8. El Fegoun MCB, Kohil K, Benguesmia M, Gouasmia S, Aissi M. Cystic Echinococcosis in Algeria: the Role of Cattle as Reservoirs in the Dynamics of Transmission of Echinococcus granulosus to Humans via Dogs. Bull Soc Pathol Exot. 2020;113(3):130-135. English. doi: 10.3166/bspe-2020-0130. PMID: 33825395.
9. Negash K, Beyene D, Kumsa B. Cystic echinococcosis in cattle slaughtered at Shashemanne Municipal Abattoir, south central Oromia, Ethiopia: prevalence, cyst distribution and fertility. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2013 Apr;107(4):229-34. doi:1093/trstmh/trt003. Epub 2013 Feb 13. PMID: 23407344.
10. Ma T, Wang Q, Hao M, Xue C, Wang X, Han S, Wang Q, Zhao J, Ma X, Wu X, Jiang X, Cao L, Yang Y, Feng Y, Gongsang Q, Scheffran J, Fang L, Maude RJ, Zheng C, Ding F, Wu W, Jiang D. Epidemiological characteristics and risk factors for cystic and alveolar echinococcosis in China: an analysis of a national population-based field survey. Parasit Vectors. 2023 Jun 3;16(1):181. doi: 10.1186/s13071-023-05788-z. PMID: 37270512; PMCID: PMC10239570.

References

1. Tazhbaeva D.T., Amanzhol R.A., Sulejmenov M.ZH. Vidovoj sostav i epizooticheskaya situaciya po strongilyatozam sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh v Zapadno-Kazahstanskoj oblasti // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. 2014. №15.
2. Shcsemeleva N. YU., Dudarchuk A. N., Vasil'kova V. P., Nasonov I. V. Ejmeriozy sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh i ptic // ZHivotnovodstvo i veterinarnaya medicina. 2021. №1. S.64-68.
3. Nikonorova V. G., Belova L. M., Gavrilova N. A. Sezonnye kolebaniya sochlenov parazitarnogo biocenoza nizinnih (zalivnyh) i suhodol'nyh pastbishch // Aktual'nye voprosy veterinarnoj biologii. 2022. №4 (56). S. 20-25.

4. Sulejmenov M.ZH., Abdybekova A.M., Tlepov A.A., Tuganbaev A., Dzhusupbekova N.M. Rasprostranenie vozбудитеj parazitarnyh zoonozov v Kazahstane // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. 2014. №15.
5. Gündög SÖ, Çelik F, Şimşek S. Evaluation of Parasitic Diseases in Patients Brought to Fırat University Animal Hospital. Turkiye Parazitol Derg. 2021 Dec 2;45(4):268-273. English. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.43534. PMID: 34889194.
6. Dana D, Suleiman S, Workneh N, Massa D, Levecke B, Kifleyohannes T, Anisuzamman, Mekonnen Z. Cystic echinococcosis, a food-borne zoonotic neglected tropical disease in slaughtered cattle at Jimma Town municipal abattoir, Southwest Ethiopia. Ann Parasitol. 2021;67(4):627-635. doi: 10.17420/ap6704.379. PMID: 35247303.
7. Chihai O, Umhang G, Erhan D, Boué F, Tălămbuță N, Rusu Ş, Zamornea M. Slaughterhouse survey of cystic echinococcosis in cattle and sheep from the Republic of Moldova. J Helminthol. 2016 May;90(3):279-83. doi: 10.1017/S0022149X15000103. Epub 2015 Mar 2. PMID: 25727141.
8. El Fegoun MCB, Kohil K, Benguesmia M, Gouasmia S, Aissi M. Cystic Echinococcosis in Algeria: the Role of Cattle as Reservoirs in the Dynamics of Transmission of Echinococcus granulosus to Humans via Dogs. Bull Soc Pathol Exot. 2020;113(3):130-135. English. doi: 10.3166/bspe-2020-0130. PMID: 33825395.
9. Negash K, Beyene D, Kumsa B. Cystic echinococcosis in cattle slaughtered at Shashemanne Municipal Abattoir, south central Oromia, Ethiopia: prevalence, cyst distribution and fertility. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2013 Apr;107(4):229-34. doi:1093/trstmh/trt003. Epub 2013 Feb 13. PMID: 23407344.
10. Ma T, Wang Q, Hao M, Xue C, Wang X, Han S, Wang Q, Zhao J, Ma X, Wu X, Jiang X, Cao L, Yang Y, Feng Y, Gongsang Q, Scheffran J, Fang L, Maude RJ, Zheng C, Ding F, Wu W, Jiang D. Epidemiological characteristics and risk factors for cystic and alveolar echinococcosis in China: an analysis of a national population-based field survey. Parasit Vectors. 2023 Jun 3;16(1):181. doi: 10.1186/s13071-023-05788-z. PMID: 37270512; PMCID: PMC10239570.

С.Д.Тусупов¹

¹Шәкәрім университеті, Абай облысы, Семей қаласы, Глинка көшесі, 20А, 071412, Қазақстан, е-mail:serik_tussupov@mail.ru

Абай ауданының шаруа қожалықтарында түйе эймериозына қарсы қарастырылған жағдайлар және таралуы

Мақалада Қазақстан, Абай облысының шаруа қожалықтарында түйе эймериозының таралуы мен оны бақылау шаралары талқыланады. Зерттеу барысында 2160 түйе басы, оның ішінде кәмелетке толмағандар мен ересектер эймерия түрлерін ооцисттермен саралау әдістерін қолдана отырып қамтылды. Эймерионың негізгі үш түрі анықталды: Э. дромедарий, Э. камели және Э. нозеллері, олардың морфологиялық ерекшеліктері мен споралы кезеңдерін сипаттай отырып. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде түйе эймериозы Абай облысының мал шаруашылықтарында барлық жерде кездесетіні анықталды. Түйенің эймериямен жұғуының маусымдық-жас динамикасын зерттеу үшін түрлі жастағы 1080 түйе зерттелді, олардың 347 басы (12%) эймерия жүктірған. Зерттеу ай сайын Абай облысының Абай және Ақсат аудандарының шаруа қожалықтарында жүргізілді.

Түйелердің эймериямен жұғу факторларын анықтау үшін торлардан көң үлгілерінде, еденинен жемшөп қалдықтары мен қоректенірғаштерде, суару орнынан алынған суда және т.б. эймерионың ооцисттерінің құрамы бойынша зерттеулер жүргізілді.

Біз өз жұмысымызда ең алдымен мынадай дәрілерге назар аудардық: коквимед пен амидиостат, өйткені олар алғаш рет түйе эймериозына қарсы сынақтан өтті.

Зерттеу нәтижелері фермерлердің эймериозды диагностикалау және алдын алу әдістері туралы хабардар болуын арттырудың маңыздылығын, сондай-ақ ауруды бақылаудың тиімді стратегиясын өзірлеу қажеттігін көрсетеді.

Бұл түйелерді ұстаса жағдайын жақсартуға және облыстағы шаруа қожалықтарының өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздері: Эймерия, ооцисты, түйе, паразиттер, маусымдық-жас динамикасы, коккимед, амидиостат, су қоймалары.

S.D.Tussupov¹

¹Shakarim University, Abay Region, Semey, 20A Glinka Street, 071412, Kazakhstan, e-mail:serik_tussupov@mail.ru

Distribution and measures to combat camel eimeriosis in peasant farms of the Abai region

Abstract: The article discusses the spread and measures of control of camel eimeriosis in the peasant farms of the Abai region, Kazakhstan.

The study covers 2160 camels, including juveniles and adults, using methods to differentiate eimeria species by oocysts. Three main species of eimeria have been identified: *E. dromedarii*, *E. cameli* and *E. noelleri*, with a description of their morphological characteristics and sporulation periods.

As a result of the research, it was found that camel eimeriosis is found everywhere in the livestock farms of the Abai region. To study the seasonal-age dynamics of camel infection with eimeria, 1080 camels of different ages were studied, 347 heads (12%) of them were infected with eimeria. The studies were carried out monthly in peasant farms of the Abay and Aksuat districts of the Abay region.

To determine the factors of infection of camels with eimeria, studies were carried out on the content of oocysts of eimeria in samples of manure from cages, feed residues from the floor and feeders, water from the watering place, and others. In our work, we paid attention, first of all, to the following drugs: cocquimede and amidiostat, since they were first tested against camel eimeriosis.

The results of the study highlight the importance of raising farmers' awareness of methods for diagnosing and preventing eimeriosis, as well as the need to develop effective strategies to control the disease. This will improve the conditions for keeping camels and increase the productivity of peasant farms in the region.

Key words: Aimeria, oocysts, camels, parasites, seasonal-age dynamics, cocquimede, amidiostat, reservoirs.

Сведения об авторах

Тусупов Серик Джумакасович, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры «Ветеринария», НАО «Шәкәрім университет», e-mail:serik_tussupov@mail.ru

Information about authors

Tussupov Serik Dzhumakasovich, candidate of veterinary sciences, senior lecturer of the department of veterinary medicine, Shakarim University, e-mail:serik_tussupov@mail.ru

МРНТИ 68.41.49

Д.Б.Зайнеттинова¹, Н.Н.Мухамадиева¹, М.Н.Джуланов², Ж.М.Нуржуманова¹

¹ НАО «Университет Шакарима», ул. Глинки 20а, 071412, Казахстан.

² НАО «Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет», 050010 г.Алматы, проспект Абая, 8, Казахстан.

*e-mail:tnt_rani@mail.ru

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИНОЗНОГО МАСТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: Мастит, или воспаление молочной железы, представляет собой распространённую патологию у молочных коров, имеющую существенное экономическое